



Is gene therapy for limb ischemia a reality?

Terapia gênica de isquemia de membro é uma realidade?

Sang Won Han^{1,2} , Carlos Alberto Vergani Junior² , Paulo Eduardo Ocke Reis³ 

Abstract

The concept of angiogenic therapy emerged in the early 1990s. The method employs genes that encode growth factors to promote formation of new vessels and remodeling of collateral vessels. Since the procedure involved in this therapy usually only consists of local injections of vectors, the process is minimally invasive, quick, and simple to perform. However, since the first clinical evidence of the effects of gene therapy with vascular endothelial growth factor (VEGF) was observed in patients with peripheral artery disease, to date only two angiogenic therapy drugs have been approved, one in Russia and another in Japan, which seem a very small number, in view of the large volume of investment made in pre-clinical and clinical studies. After all, can we conclude that angiogenic therapy is a reality?

Keywords: gene therapy; atherosclerosis; peripheral artery disease; limb ischemia.

Resumo

O conceito de terapia angiogênica surgiu no início da década de 90, o que pode ser feito com genes que codificam fatores de crescimento para promover a formação de novos vasos e o remodelamento de vasos colaterais. Como o procedimento dessa terapia geralmente consiste em apenas injeções locais de vetores, esse processo é pouco invasivo, rápido e de simples realização. Entretanto, desde as primeiras evidências clínicas do efeito de terapia gênica com o fator de crescimento de endotélio vascular (*vascular endothelial growth factor*, VEGF) vistos nos pacientes com doença arterial obstrutiva periférica até hoje, apenas dois fármacos de terapia angiogênica foram aprovados, um na Rússia e outro no Japão, o que parece um número muito pequeno diante do grande número de investimentos feitos por meio de estudos pré-clínicos e clínicos. Afinal, podemos considerar que a terapia angiogênica já é uma realidade?

Palavras-chave: terapia gênica; aterosclerose; doença arterial periférica; isquemia de membro.

How to cite: Han SW, Vergani Junior CA, Reis PEO. Is gene therapy for limb ischemia a reality? J Vasc Bras. 2020;19:e20190059. <https://doi.org/10.1590/1677-5449.190059>

¹ Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, Departamento de Biofísica, Escola Paulista de Medicina, São Paulo, SP, Brasil.

² Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, Centro Interdisciplinar de Terapia Gênica – CINTERGEN, São Paulo, SP, Brasil.

³ Universidade Federal Fluminense – UFF, Departamento de Cirurgia Geral e Especializada, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Financial support: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) 2015/20206-8.

Conflicts of interest: No conflicts of interest declared concerning the publication of this article.

Submitted: May 22, 2019. Accepted: December 15, 2019.

The study was carried out at Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo, SP, Brazil.

■ INTRODUCTION

Cases of peripheral arterial occlusive disease (PAOD) increase significantly among people more than 70 years old and who have diabetes.^{1,2} As the global population becomes ever older and engages in bad habits such as inactivity and poor diet acquired in conjunction with modern lifestyles, the prevalence rates of diabetes and morbid obesity have also increased, provoking further increases in the number of patients with PAOD. This disease is silent during its initial phases and it is discovered when the pathology is already advanced, making prevention and treatment difficult. The main symptom of the initial progression of PAOD is pain when walking, termed intermittent claudication. As the disease progresses, there is pain even when at rest, which is more intense at night, and ulcers develop on the lower limbs that do not heal easily. These symptoms are a consequence of progressive reductions in tissue perfusion and are characteristic of critical lower limb ischemia (CLI).³

The principal cause of PAOD is atherosclerosis, which can affect arteries all over the body. This is why it is associated with other obstructive arterial diseases (coronary, cerebral, and carotid) and, consequently, the risk of cardiovascular events such as stroke and myocardial infarction increases by around 6% per year in patients with PAOD⁴. According to the Transatlantic Inter-Society Consensus,² approximately 30% of patients with CLI will undergo an amputation, because revascularization and clinical treatments are not feasible in this population, and 25% of these patients will die within 1 year. Each patient's course is variable and the stage of the disease is symptom-dependent, so prognosis varies from case to case. Patients with PAOD over the age of 50 have worse prognosis within 5 years: approximately 10% will undergo limb amputations and another 10-15% will die from cardiovascular diseases. In summary, all these data indicate worsening prognosis for modern society, which is aging progressively and has unhealthy habits.

Since atherosclerosis is the principal cause of PAOD and of cardiovascular diseases, the clinical treatments for these are similar to those used with patients with cardiovascular ischemia, including medications to reduce lipids, to control hypertension, to prevent platelet aggregation, and of glycemia for diabetic patients with PAOD.⁵ Intermittent claudication is one of the primary initial symptoms of disease that may progress to CLI and the medication most frequently used to treat is cilostazol, which inhibits phosphodiesterase type III and acts as an antiplatelet agent and a vasodilator.⁵ However, pharmacotherapy that acts on the endothelium to provoke vasodilation, angiogenesis, and remodeling of vessels with the

aim of improving these patients' vascular function has demonstrated little benefit, probably because their arteries are already in an environment with atherosclerosis, fibrosis, and calcification, interfering with adequate interaction between the drugs and their receptors.

Currently, the procedures most frequently used to treat CLI are revascularization surgery and percutaneous angioplasty. However, since patients with CLI are, in general, elderly, smokers, and diabetic, approximately 30% of them cannot undergo a vascular procedure despite all of the development that has occurred in the field, and amputation is often the only option. In the United States alone, it is estimated that 120 to 500 lower limb amputations are performed per million inhabitants every year.² Spending on treatments for peripheral arterial diseases in the United States passed 4 billion dollars in 2001,⁶ and the figure is likely to increase annually as risk factors such as diabetes and obesity increase and life expectancy extends.

Faced with the prediction of a continuous increase in the numbers of patients with PAOD and the limitations of conventional treatment options, whether open bypass surgery or angioplasties with balloon angioplasty and stenting to revascularize limbs, gene therapy with genes that express growth factors emerged as a possible solution to these problems at the start of the 1990s. This review article summarizes clinical trials of gene therapy for limb ischemia and offers the authors' opinions on the future of angiogenic therapy.

■ THE CONCEPT OF ANGIOGENIC THERAPY WITH GENES, CELLS, AND PROTEINS

The new proposal is to treat ischemic diseases using growth factors to provoke formation of new vessels and/or remodeling of dysfunctional vessels. These factors, which are proteins, can be administered in their protein form, or via genes or cells that express these factors and the treatment modality is known as therapeutic angiogenesis.⁷ In comparison to surgery, therapeutic angiogenesis is much less invasive and execution is simpler, generally performed by means of a simple injection into the target tissues. Moreover, since the active agents are growth factors, their activities are specific to only those cells that express their receptors and so, as a consequence, gene and protein-based methods should have fewer secondary effects than cell-based therapies, because cells produce a large number of different factors. The most important characteristics of each type of treatment are summarized in Table 1.

The concept of using genes to treat diseases emerged at the end of the 1960s when synthetic biology became a reality with the discovery of the structure of DNA, of

Table 1. Comparison of angiogenic therapies.

| | Protein therapy ¹ (PT) | Cell therapy ² (CT) | Gene therapy ³ (GT) |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Complexity of production | +++ | + / ++ | +++ |
| Cost of production | ++ / +++ | + / ++ | ++/+++ |
| Stability of drug | + | + | ++ / +++ |
| Applicability across different patients | Yes | No | Yes |
| Durability of therapeutic effects | + | + / ++ | ++ / +++ |
| Immunogenicity | - / + | - / + | + (pDNA, AAV, RV, LV); +++ (AdV) |

¹therapy using human proteins; ²therapy using autologous cells; ³therapy using human genes; pDNA (plasmid vectors); AAV (adenovirus-associated vector); RV (retroviral vector); LV (lentiviral vector); AdV (adenoviral vector). The signs represent the intensity of the parameters analyzed: high (+++), moderate (++), low (+) or none (-).

genetic codes, and of enzymes for genetic engineering, among others.⁸ However, the first clinical trial with gene therapy was only conducted in 1990, in the United States, after approval of the protocol by the US Federal agency, the Food and Drug Administration (FDA). The trial involved treatment of two patients with severe combined immunodeficiency caused by the deficiency of adenosine deaminase (SCID-ADA).⁹ Since then, 2,597 trials had been approved worldwide, up to 2019, according to the website.¹⁰

Gene therapy is performed by transferring a vector carrying therapeutic genes to the patient, which can be done directly to the patient (in vivo gene therapy) or using genetically modified cells (ex vivo gene therapy). The majority of clinical gene therapies for PAOD have been in vivo using plasmid (pDNA) or adenovirus vectors (Ad), because they have a good capacity for in vivo transfection (non-viral vectors) or transduction (viral vectors). Adenoviral vectors are more effective for gene transfer than pDNA vectors, but because capsid proteins are very immunogenic, the prior immunoresponse must be controlled for repeated administrations.¹¹ Another disadvantage of using Ad is the greater complexity of vector production and quality control, which makes the process more expensive than using pDNA. On the other hand, using pDNA for gene therapy requires greater quantities of the vector or a carrier (for example, liposomes) to compensate for the low efficiency of gene transfer in vivo, but since these vectors are considered much less immunogenic and more stable than viral vectors, there are a considerable number of clinical trials using pDNA.¹⁰

■ CLINICAL TRIALS OF GENE THERAPY FOR LIMB ISCHEMIA

Clinical trials of angiogenic therapies conducted to date have used just a single gene at a time to promote formation of new vessels from preexisting vessels by sprouting (angiogenesis) and/or from precursor endothelial cells (vasculogenesis) and/or

by remodeling of collateral vessels (arteriogenesis) (Figure 1).¹² The procedure used for gene therapy is very simple, consisting of intramuscular injections of vectors (Figure 2), but the technology used to create and produce these vectors, that are designed to change the state of functionally altered and pathological tissues, is complex.

The genes most often used for angiogenic therapy in clinical trials include the genes for vascular endothelium growth factor (VEGF),¹³ for fibroblast growth factor (FGF)¹⁴, for hepatocyte growth factor (HGF)¹⁵ and for hypoxia inducible factor (HIF-1 α)^{16,17}. Details of these factors and the clinical trials involving their genes are described below.

HIF-1 α (hypoxia inducible factor -1 α): this factor is constitutively encoded by the human HIF-1 α gene and is located in cytosol. In normoxic conditions, this factor is degraded by ubiquitination, but under hypoxia it translocates to the nucleus and joins with HIF-1 β and other accessory factors to form a protein complex that acts in transcription of more than 60 genes. In general, these genes are linked with angiogenesis (for example, the VEGF gene), erythropoiesis, gluconeogenesis, and vasodilation, whose activities are intimately related to survival under hypoxia.¹⁸

Use of this gene was tested in a clinical trial named the WALK study in patients with PAOD and intermittent claudication.¹⁶ In this study, 289 patients received 20 injections of the adenoviral vector Ad2/HIF-1 α /VP16 into muscles affected by ischemia. The patients were monitored for 12 months, and changes in walking were observed. The study was double-blind and randomized. Median peak walking time was 0.82 minutes in the placebo group and 0.82 minutes, 0.28 minutes, and 0.78 minutes in experimental groups given doses of 2×10^9 , 2×10^{10} , and 2×10^{11} of Ad2/HIF-1 α /VP16, respectively. There was no significant difference in ankle-brachial index (ABI) or in quality of life between groups treated with placebo and groups treated with the Ad2/HIF-1 α /VP16 vector. Therefore, the authors concluded that the gene therapy investigated in the




Figure 1. Image illustrating formation and remodeling of vessels in adulthood. Angiogenesis, vasculogenesis, and arteriogenesis are processes that lead to formation and remodeling of vessels in adulthood (the details of these processes are described in the text). EPC: endothelial precursor cell.




Figure 2. Image illustrating gene therapy for critical limb ischemia with growth factor genes.

study was not an effective treatment for patients with intermittent claudication.

FGF-1 (fibroblast growth factor-1): also known as aFGF (acid FGF) is member of the FGF family, which has several biological activities such as endothelial cell proliferation and migration, angiogenesis, cell survival, morphogenesis, and tissue repair, among others. Several activities related to angiogenesis observed *in vitro* and *in vivo* studies prompted testing of FGF in patients.^{19,20} Among the several clinical trials using this growth factor, those conducted using the non-viral 1 FGF-1 vector (NV1FGF) are probably the best known. The NV1FGF vector is a plasmid vector for expression of FGF-1 that was designed and produced by Sanofi-Aventis. Although FGF1 is a non-integrating vector, its expression has persisted in muscle for several weeks in some patients.²¹

The results of the phase I²² and II²³ clinical trials satisfactorily achieved their proposed objectives, enabling progression to phase III.²⁴ The phase III study, known as TAMARIS, was a multicenter, double-blind, and randomized study conducted at

171 centers in 30 countries. The 525 patients who participated in the study were in a clinical condition that was inappropriate for revascularization and had ischemic ulcers or gangrene. Hemodynamic parameters for study enrollment were ankle pressure < 70 mmHg and/or toe pressure < 50 mmHg, or transcutaneous oxygen pressure < 30 mmHg. The primary objective of this study was to demonstrate the clinical benefits of NV1FGF in extending survival time to major amputation or death of patients with limb ischemia and non-healing ulcers in whom revascularization was infeasible. The patients received eight intramuscular injections of 0.5 mg of NV1FGF or placebo at approximately 2-week intervals. The numbers of amputations and deaths were not statistically different between groups treated with NV1FGF and placebo, i.e., the therapeutic effect of NV1FGF was not demonstrated.

HGF (hepatocyte growth factor): it is another pleiotropic factor that acts on several physiological activities such as cell proliferation, angiogenesis, morphogenesis, and motility.²⁵ Endothelial and smooth muscle cells express the HGF receptor cMet

and are the principal cells related to angiogenesis.²⁶ Intramuscular injection of pDNA expressing HGF in animals demonstrated angiogenic activity, prompting the first gene therapy clinical trials. Morishita et al. conducted a phase I/IIa clinical trial with 22 patients with peripheral arterial disease or Buerger disease at Fontaine stages IIb to IV with four or eight injections of pDNA expressing HGF (2 mg at four sites or 4 mg at eight sites) on days 1 and 28. The main findings that led to continuation of the study were increased ABI and reductions in ulcers and pain.²⁷ A phase III, randomized, double-blind, and placebo-controlled study was then conducted with 44 patients.²⁸ The primary objectives were improvement of pain at rest or reductions in ulcers in patients with ulcers, and the secondary objectives were improvement of ABI, amputation rates, and quality of life. There was a significant improvement in primary objectives and quality of life without significant negative effects, but the amputation rate and ABI did not improve. This gene therapeutic drug (Collatogene) was conditionally approved in Japan in 2019.

The BM202 vector is a plasmid that expresses two isoforms of HGF.²⁹ Oddly, expression of both isoforms led to a significant improvement in ABI, which was not observed in the study by Shigematsu et al.²⁸ Based on that study, a phase II study was approved and is ongoing.

VEGF (vascular endothelial growth factor): this is the growth factor that has been most studied for angiogenic therapy. There are four main isoforms (VEGF A, B, C, and D), and alternative splicing, which is a process for alternative substitution of introns and joining of exons to form a new mRNA, leads to formation of additional isoforms. Human VEGF A can form VEGF121, VEGF165, VEGF189, and VEGF206, the first two of which are most used for gene therapy. It was recently observed that the native or modified forms of the VEGF D isoform, which act in lymphangiogenesis, can also actively promote angiogenesis.^{30,31} The receptors of VEGF are Flt-1 and Flk-1, also known as VEGFR-1 and VEGFR-2, respectively. The VEGFR-1 receptor binds to VEGF A and B, while VEGFR-2 only binds to VEGF A.³² The VEGFR receptors act in conjunction with neuropilin-1, which is considered a coreceptor of VEGF. Both VEGFR-1 and VEGFR-2 are present in endothelial cells.

The pioneering work with angiogenic therapy was initiated in 1994 by Jeffrey Isner and his team, showing that formation of vessels could be stimulated with a plasmid vector expressing VEGF165 (phVEGF165) at the tip of a hydrogel catheter.³³ Years later, the same group conducted another clinical study, administering

phVEGF165 directly into the ischemic limbs of patients with PAOD. In that study, two applications of 2 mg of phVEGF165 were administered with a 2-week interval.³⁴ Mean ABI increased significantly and formation of collateral vessels was demonstrated by angiography with contrast and magnetic resonance angiography. There was significant improvement in healing of ulcers in several patients. In addition to demonstrating the efficacy of angiogenic therapy for treatment of ischemic diseases, this study also demonstrated use of the plasmid vector for ischemic diseases, which is a vector that is simpler to design and produce than other vectors, and, in combination with the simple method of administration, this marked the start of a new era in angiogenic therapy.

A number of different clinical trials of angiogenic therapy with VEGF have been conducted.¹⁰ Although the initial results were encouraging, studies conducted later with larger sample sizes reported controversial results. For example, a phase II study by Kusumanto et al.,³⁵ in which phVEGF165 was administered to 54 diabetic patients with critical limb ischemia, was unable to demonstrate improvements in terms of reductions in amputation at 100 days, despite having demonstrated significant improvements in pain, ulcer healing, and ABI in some patients. Another phase II study, this one using the adenoviral vector VEGF121 (AdVEGF121), was conducted with 105 patients with peripheral arterial disease.³⁶ The primary objective of increasing walking time at 12 weeks was not achieved, and edema was observed in several patients after administration of the vector. The study's conclusion was that intramuscular administration of the AdVEGF121 vector was not associated with improved exercise performance or quality of life. These and other clinical trials of angiogenic therapy with VEGF reported controversial efficacy results.

Despite these controversies, in 2011, a plasmid VEGF165 vector, given the commercial name Neovasculgen, was approved in Russia for treatment of patients with limb ischemia after a phase IIb/III clinical trial with 100 patients. Patients in this randomized study were treated twice with 1.2 mg of the pCMV-vegfl65 vector with a 14-day interval, or were given conventional treatment in the control group.³⁷ The distance walked without pain increased 110.4%, 167.2%, and 190.8%, 6 months, 1 year, and 2 years after treatment, respectively. Additionally, ABI and blood flow velocity also improved significantly. The authors concluded the article stating that treatment with pCMV-vegfl65 is an effective method for treatment of moderate to severe claudication caused by CLI.

Why are the promising results observed in pre-clinical trials not replicated at the same proportion in clinical trials?

In general, pre-clinical studies of gene therapy for limb ischemia have employed mice for testing. Ischemia is induced surgically by closure of the distal and proximal femoral artery followed by removal of the arterial segment. In some models, the collateral arteries are also closed to induce severe ischemia.³⁸ As a result, local circulation is drastically reduced, to the extent that no flow can be detected with laser Doppler perfusion imaging (LDPI) soon after surgery. Although ischemia is rapidly established by this procedure, its pathophysiology is very different from that caused by atherosclerosis, which is a slow process that occurs with the deposition of fats and cells on the artery wall. It is, therefore, a sub-representative model of the human disease.

Furthermore, the mouse strain most often used in these studies is C57/Bl6, possibly because of the availability of a large amount of information about this strain and the low cost of obtaining and maintaining these mice. However, when these studies are compared with other similar studies conducted with the Balb/c strain, there is a notable difference in the degree of ischemia and the results of the treatments applied. Nowadays, it is known that this occurs because there is a significant difference in the vascular anatomy of these mouse strains due to the genetic variation³⁹ and because the Balb/c lineage is much more sensitive to ischemia than the C57/Bl6 strain. If the degree of ischemia generated and the responses to angiogenic therapies are so different between two mouse strains, how great a difference might there be between mice and human patients?

Emergence of PAOD is a consequence of the interplay between risk factors and the genetic factors that each individual carries. Therefore, pathophysiologic variations between patients are great, whereas in the animal model the variation is minimal because the environment has been conditioned to reduce variations as much as possible, in order to facilitate interpretation of the results. What are the chances that a drug tested successfully in an animal model under these conditions will have the same benefits for patients with PAOD?

■ PROSPECTS FOR ANGIOGENIC TREATMENTS FOR LIMB ISCHEMIA

To date, just two angiogenic therapy drugs have been approved; Neovasculgen in Russia in 2011, and Collategene in Japan in 2019. It is important to point out that both drugs are based on plasmid vectors carrying growth factors that act on endothelial cells to

promote angiogenesis. As mentioned above, vectors derived from plasmids are simply DNA molecules, so there is no danger that they will replicate in the body,⁴⁰ which is a great advantage over viral vectors. Furthermore, production and quality control are simpler and less expensive than with viral vectors.

However, the effectiveness of these drugs is still questionable, because there are conflicting clinical trial results. Formation of vessels is a complex process involving proliferation and differentiation of precursor cells under the control of many regulatory molecules.⁴¹ Therefore, using a single factor that specifically acts on endothelial cells is possibly insufficient to form a mature vessel in an ischemic and inflamed environment.

The ideal angiogenic treatment for limb ischemia would be one that can act on all or a majority of the cells and molecules that participate in angiogenesis and control of inflammation. Below, we suggest some ways to achieve this ideal treatment.

1. Using more angiogenic genes: to date, all of the clinical trials of gene therapy have been conducted using a single gene per trial. Since many genes are essential to angiogenesis, use of more than one of these genes could produce better therapeutic effects. In practice, this is possible using bicistronic or tricistronic vectors or cotransfection of several monocistronic vectors to express several genes simultaneously in the target tissues;
2. Using genetically modified stem cells: stem cells have the plasticity to differentiate into other cell types and express several pro-angiogenic growth factors. Of the known types of stem cells, mesenchymal stem cells are the most useful for clinical use, because of the ease of obtaining them in large quantities from bone marrow and fat and their capacity to promote angiogenesis.⁴² However, guiding their differentiation into a cell type and a type of activity is primarily dependent on the cells' microenvironment. Genetic modifications with the vectors used for gene therapy could be used to direct pro-angiogenic differentiation and activity, performing *ex vivo* gene therapy;⁴³
3. Using hematopoiesis genes: hematopoiesis, ischemia, and inflammation are intimately interconnected biological processes. Ischemia and inflammation stimulate hematopoiesis to produce more blood cells, and monocytes and macrophages are the principal elements that participate in control of inflammation and angiogenesis.⁴⁴ Monocyte and macrophage subpopulations can be classified according to their inflammatory activities

as proinflammatory or anti-inflammatory.⁴⁵ These subpopulations can promote or inhibit angiogenesis and fibrogenesis for repair of ischemic and inflamed tissues. The genes that code for colony stimulating factors such as granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF), granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF), and macrophage colony-stimulating factor (M-CSF), and interleukins such as IL4 and IL13 participate in directing and increasing these subpopulations of monocytes and macrophages. Therefore, used correctly, these genes could lead to formation and remodeling of vessels in a more efficient manner in the ischemic and inflamed environment.^{46,47}

In summary, it can be stated that gene therapy for limb ischemia is already a clinical reality, since the two gene therapy drugs are already available on the market. The efficacy of the drugs covered in this review is still questionable, but what is important is that the history of gene therapy shows that scientific and technological research are overcoming the barriers of the unknown and are enabling creation of new, more effective, and safer drugs with natural or synthetic genetic materials in combination with nanocarriers or genetically modified viruses. In Brazil, the regulatory framework for advanced therapies including gene therapy, cell therapy, and tissue engineering was approved this year by the National Agency for Sanitary Vigilance (Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA).⁴⁸ As a result, gene therapy drugs that have already been approved or are under clinical trials in other countries can be sold or tested in Brazil. In view of this, it is important that Brazilian medicine is prepared to take advantage of these technologies and their products, by keeping up to date.

■ REFERENCES

- Fowkes FG, Rudan D, Rudan I, et al. Comparison of global estimates of prevalence and risk factors for peripheral artery disease in 2000 and 2010: a systematic review and analysis. *Lancet*. 2013;2013(382):1329-40. [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)61249-0](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61249-0). PMID:23915883.
- Norgren L, Hiatt WR, Dormandy JA, Nehler MR, Harris KA, Fowkes FGR. Inter-society consensus for the management of peripheral arterial disease (TASC II). *J Vasc Surg*. 2007;45(1 Suppl):S5-67. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jvs.2006.12.037>.
- Stoyioglou A, Jaff MR. Medical treatment of peripheral arterial disease: a comprehensive review. *J Vasc Interv Radiol*. 2004;2004(15):1197-207. <http://dx.doi.org/10.1097/01.RVI.0000137978.15352.C6>. PMID:15525738.
- Criqui MH, Langer RD, Fronck A, et al. Mortality over a period of 10 years in patients with peripheral arterial disease. *N Engl J Med*. 1992;1992(326):381-6. <http://dx.doi.org/10.1056/NEJM199202063260605>. PMID:1729621.
- McCann AB, Jaff MR. Treatment strategies for peripheral artery disease. *Expert Opin Pharmacother*. 2009;2009(10):1571-86. <http://dx.doi.org/10.1517/14656560902988502>. PMID:19527186.
- Hirsch AT, Hartman L, Town RJ, Virnig BA. National health care costs of peripheral arterial disease in the Medicare population. *Vasc Med*. 2008;13(3):209-15. <http://dx.doi.org/10.1177/1358863X08089277>. PMID:18687757.
- Isner JM. Therapeutic angiogenesis: a new frontier for vascular therapy. *Vasc Med*. 1996;1(1):79-87. <http://dx.doi.org/10.1177/1358863X9600100114>. PMID:9546920.
- Friedmann T, Roblin R. Gene therapy for human genetic disease? *Science*. 1972;1972(175):949-55. <http://dx.doi.org/10.1126/science.175.4025.949>. PMID:5061866.
- Blaese RM, Culver KW, Miller AD, et al. T lymphocyte-directed gene therapy for ADA- SCID: initial trial results after 4 years. *Science*. 1995;1995(270):475-80. <http://dx.doi.org/10.1126/science.270.5235.475>. PMID:7570001.
- Abedia. [site on the Internet]. United Kingdom: John Wiley and Sons Ltd.; 2019. [cited 2019 may 22]. <http://www.abedia.com/wiley/>.
- Schirmbeck R, Reimann J, Kochanek S, Kreppel F. The immunogenicity of adenovirus vectors limits the multispecificity of CD8 T-cell responses to vector-encoded transgenic antigens. *Mol Ther*. 2008;2008(16):1609-16. <http://dx.doi.org/10.1038/mt.2008.141>. PMID:18612271.
- Carmeliet P. Mechanisms of angiogenesis and arteriogenesis. *Nat Med*. 2000;6(4):389-95. <http://dx.doi.org/10.1038/74651>. PMID:10742145.
- Ferrara N, Gerber HP, LeCouter J. The biology of VEGF and its receptors. *Nat Med*. 2003;9(6):669-76. <http://dx.doi.org/10.1038/nm0603-669>. PMID:12778165.
- Beenken A, Mohammadi M. The FGF family: biology, pathophysiology and therapy. *Nat Rev Drug Discov*. 2009;8(3):235-53. <http://dx.doi.org/10.1038/nrd2792>. PMID:19247306.
- Morishita R, Aoki M, Hashiya N, et al. Therapeutic angiogenesis using hepatocyte growth factor (HGF). *Curr Gene Ther*. 2004;4(2):199-206. <http://dx.doi.org/10.2174/1566523043346453>. PMID:15180586.
- Creager MA, Olin JW, Belch JJ, et al. Effect of hypoxia-inducible factor-1alpha gene therapy on walking performance in patients with intermittent claudication. *Circulation*. 2011;2011(124):1765-73. <http://dx.doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.110.009407>. PMID:21947297.
- Rajagopalan S, Olin J, Deitcher S, et al. Use of a constitutively active hypoxia-inducible factor-1alpha transgene as a therapeutic strategy in no-option critical limb ischemia patients: phase I dose-escalation experience. *Circulation*. 2007;2007(115):1234-43. <http://dx.doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.106.607994>. PMID:17309918.
- Krock BL, Skuli N, Simon MC. Hypoxia-induced angiogenesis: good and evil. *Genes Cancer*. 2012;2011(2):1117-33. <http://dx.doi.org/10.1177/1947601911423654>. PMID:22866203.
- Burgess WH, Maciag T. The heparin-binding (fibroblast) growth factor family of proteins. *Annu Rev Biochem*. 1989;1989(58):575-606. <http://dx.doi.org/10.1146/annurev.bi.58.070189.003043>. PMID:2549857.
- Cao R, Brakenhielm E, Pawliuk R, et al. Angiogenic synergism, vascular stability and improvement of hind-limb ischemia by a combination of PDGF-BB and FGF-2. *Nat Med*. 2003;2003(9):604-13. <http://dx.doi.org/10.1038/nm848>. PMID:12669032.

21. Baumgartner I, Chronos N, Comerota A, et al. Local gene transfer and expression following intramuscular administration of FGF-1 plasmid DNA in patients with critical limb ischemia. *Mol Ther*. 2009;17(5):914-21. <http://dx.doi.org/10.1038/mt.2009.24>. PMID:19240689.
22. Comerota AJ, Throm RC, Miller KA, et al. Naked plasmid DNA encoding fibroblast growth factor type 1 for the treatment of end-stage unreconstructible lower extremity ischemia: preliminary results of a phase I trial. *J Vasc Surg*. 2002;2002(35):930-6. <http://dx.doi.org/10.1067/mva.2002.123677>. PMID:12021709.
23. Nikol S, Baumgartner I, Van Belle E, et al. Therapeutic angiogenesis with intramuscular NV1FGF improves amputation-free survival in patients with critical limb ischemia. *Mol Ther*. 2008;16(5):972-8. <http://dx.doi.org/10.1038/mt.2008.33>.
24. Belch J, Hiatt WR, Baumgartner I, et al. Effect of fibroblast growth factor NV1FGF on amputation and death: a randomised placebo-controlled trial of gene therapy in critical limb ischaemia. *Lancet*. 2011;2011(377):1929-37. [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(11\)60394-2](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60394-2). PMID:21621834.
25. Nakamura T, Mizuno S. The discovery of hepatocyte growth factor (HGF) and its significance for cell biology, life sciences and clinical medicine. *Proc Jpn Acad, Ser B, Phys Biol Sci*. 2010;2010(86):588-610. <http://dx.doi.org/10.2183/pjab.86.588>. PMID:20551596.
26. Kaga T, Kawano H, Sakaguchi M, Nakazawa T, Taniyama Y, Morishita R. Hepatocyte growth factor stimulated angiogenesis without inflammation: differential actions between hepatocyte growth factor, vascular endothelial growth factor and basic fibroblast growth factor. *Vascu Pharmacol*. 2012;2012(57):3-9. <http://dx.doi.org/10.1016/j.vph.2012.02.002>. PMID:22361334.
27. Morishita R, Makino H, Aoki M, et al. Phase I/IIa clinical trial of therapeutic angiogenesis using hepatocyte growth factor gene transfer to treat critical limb ischemia. *Arterioscler Thromb Vasc Biol*. 2010;2011(31):713-20. <http://dx.doi.org/10.1161/ATVBAHA.110.219550>. PMID:21183732.
28. Shigematsu H, Yasuda K, Iwai T, et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial of hepatocyte growth factor plasmid for critical limb ischemia. *Gene Ther*. 2010;2010(17):1152-61. <http://dx.doi.org/10.1038/gt.2010.51>. PMID:20393508.
29. Henry TD, Hirsch AT, Goldman J, et al. Safety of a non-viral plasmid-encoding dual isoforms of hepatocyte growth factor in critical limb ischemia patients: a phase I study. *Gene Ther*. 2011;2011(18):788-94. <http://dx.doi.org/10.1038/gt.2011.21>. PMID:21430785.
30. Hartikainen J, Hassinen I, Hedman A, et al. Adenoviral intramyocardial VEGF-DeltaNDeltaC gene transfer increases myocardial perfusion reserve in refractory angina patients: a phase I/IIa study with 1-year follow-up. *Eur Heart J*. 2017;2017(38):2547-55. <http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehx352>. PMID:28903476.
31. Rissanen TT, Markkanen JE, Gruchala M, et al. VEGF-D is the strongest angiogenic and lymphangiogenic effector among VEGFs delivered into skeletal muscle via adenoviruses. *Circ Res*. 2003;2003(92):1098-106. <http://dx.doi.org/10.1161/01.RES.0000073584.46059.E3>. PMID:12714562.
32. Stuttfeld E, Ballmer-Hofer K. Structure and function of VEGF receptors. *IUBMB Life*. 2009;2009(61):915-22. <http://dx.doi.org/10.1002/iub.234>. PMID:19658168.
33. Isner JM, Walsh K, Symes J, et al. Arterial gene transfer for therapeutic angiogenesis in patients with peripheral artery disease. *Hum Gene Ther*. 1996;1996(7):959-88. <http://dx.doi.org/10.1089/hum.1996.7.8-959>. PMID:8727509.
34. Baumgartner I, Pieczek A, Manor O, et al. Constitutive expression of phVEGF165 after intramuscular gene transfer promotes collateral vessel development in patients with critical limb ischemia. *Circulation*. 1998;1998(97):1114-23. <http://dx.doi.org/10.1161/01.CIR.97.12.1114>. PMID:9537336.
35. Kusumanto YH, van Weel V, Mulder NH, et al. Treatment with intramuscular vascular endothelial growth factor gene compared with placebo for patients with diabetes mellitus and critical limb ischemia: a double-blind randomized trial. *Hum Gene Ther*. 2006;2006(17):683-91. <http://dx.doi.org/10.1089/hum.2006.17.683>. PMID:16776576.
36. Rajagopalan S, Mohler ER 3rd, Lederman RJ, et al. Regional angiogenesis with vascular endothelial growth factor in peripheral arterial disease: a phase II randomized, double-blind, controlled study of adenoviral delivery of vascular endothelial growth factor 121 in patients with disabling intermittent claudication. *Circulation*. 2003;2003(108):1933-8. <http://dx.doi.org/10.1161/01.CIR.0000093398.16124.29>. PMID:14504183.
37. Deev RV, Bozo IY, Mzhavanadze ND, et al. pCMV-vegf165 intramuscular gene transfer is an effective method of treatment for patients with chronic lower limb ischemia. *J Cardiovasc Pharmacol Ther*. 2015;2015(20):473-82. <http://dx.doi.org/10.1177/1074248415574336>. PMID:25770117.
38. Martins L, Martin PK, Han SW. Angiogenic properties of mesenchymal stem cells in a mouse model of limb ischemia. *Methods Mol Biol*. 2014;1213:147-69. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-1453-1_13. PMID:25173381.
39. Dokun AO, Keum S, Hazarika S, et al. A quantitative trait locus (LSq-1) on mouse chromosome 7 is linked to the absence of tissue loss after surgical hindlimb ischemia. *Circulation*. 2008;117(9):1207-15. <http://dx.doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.107.736447>. PMID:18285563.
40. del Solar G, Giraldo R, Ruiz-Echevarria MJ, Espinosa M, Díaz-Orejas R. Replication and control of circular bacterial plasmids. *Microbiol Mol Biol Rev*. 1998;62(2):434-64. <http://dx.doi.org/10.1128/MMBR.62.2.434-464.1998>. PMID:9618448.
41. Yoshida WB. Angiogenesis, arteriogenesis and vasculogenesis: treatment of the future for lower limb critical ischemia? *J Vasc Bras*. 2005;4(4):316-8. <http://dx.doi.org/10.1590/S1677-54492005000400002>.
42. Kim Y, Kim H, Cho H, Bae Y, Suh K, Jung J. Direct comparison of human mesenchymal stem cells derived from adipose tissues and bone marrow in mediating neovascularization in response to vascular ischemia. *Cell Physiol Biochem*. 2007;20(6):867-76. <http://dx.doi.org/10.1159/000110447>. PMID:17982269.
43. Cunha FF, Martins L, Martin PKM, Stilhano RS, Paredes Gamero EJ, Han SW. Comparison of treatments of peripheral arterial disease with mesenchymal stromal cells and mesenchymal stromal cells modified with granulocyte and macrophage colony-stimulating factor. *Cytotherapy*. 2013;15(7):820-9. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jcyt.2013.02.014>. PMID:23660332.
44. Mantovani A, Biswas SK, Galdiero MR, Sica A, Locati M. Macrophage plasticity and polarization in tissue repair and remodelling. *J Pathol*. 2013;229(2):176-85. <http://dx.doi.org/10.1002/path.4133>. PMID:23096265.
45. Mantovani A, Sica A, Sozzani S, Allavena P, Vecchi A, Locati M. The chemokine system in diverse forms of macrophage activation and polarization. *Trends Immunol*. 2004;25(12):677-86. <http://dx.doi.org/10.1016/j.it.2004.09.015>. PMID:15530839.
46. Sacramento CB, Cantagalli VD, Grings M, et al. Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor gene based therapy for acute limb ischemia in a mouse model. *J Gene Med*. 2009;11(4):345-53. <http://dx.doi.org/10.1002/jgm.1298>. PMID:19194978.
47. Sacramento CB, Silva FH, Nardi NB, et al. Synergistic effect of vascular endothelial growth factor and granulocyte colony-stimulating

factor double gene therapy in mouse limb ischemia. *J Gene Med.* 2010;12(3):310-9. <http://dx.doi.org/10.1002/jgm.1434>. PMID:20077434.

48. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. *Terapias avançadas*. Brasília: ANVISA; 2019. [cited 2019 may 22]. <http://portal.anvisa.gov.br/terapias-avancadas>

Correspondence

Sang Won Han
Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, Escola Paulista de
Medicina, Departamento de Biofísica
Rua Mirassol, 207
CEP 04044-010 - São Paulo (SP) - Brasil
Tel.: +55 (11) 5576.4848, ramal 3090
E-mail: sang.han@unifesp.br, universo.han@gmail.com

Author information

SWH – PhD in Bioquímica, Universidade de São Paulo (USP).
CAVJ - Bachelor in Biomedicina, Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP).
PEOR - PhD in Ciências Morfológicas, Universidade Federal de Rio de
Janeiro (UFRJ).

Author contributions

Conception and design: SWH, CAVJ, PEOR
Analysis and interpretation: SWH, CAVJ, PEOR
Data collection: SWH, CAVJ, PEOR
Writing the article: SWH, CAVJ, PEOR
Critical revision of the article: SWH, CAVJ, PEOR
Final approval of the article*: SWH, CAVJ, PEOR
Statistical analysis: N/A.
Overall responsibility: SWH

*All authors have read and approved of the final version of the article
submitted to *J Vasc Bras*.



Terapia gênica de isquemia de membro é uma realidade?

Is gene therapy of limb ischemia a reality?

Sang Won Han^{1,2} , Carlos Alberto Vergani Junior² , Paulo Eduardo Ocke Reis³ 

Resumo

O conceito de terapia angiogênica surgiu no início da década de 90, o que pode ser feito com genes que codificam fatores de crescimento para promover a formação de novos vasos e o remodelamento de vasos colaterais. Como o procedimento dessa terapia geralmente consiste em apenas injeções locais de vetores, esse processo é pouco invasivo, rápido e de simples realização. Entretanto, desde as primeiras evidências clínicas do efeito de terapia gênica com o fator de crescimento de endotélio vascular (*vascular endothelial growth factor*, VEGF) vistos nos pacientes com doença arterial obstrutiva periférica até hoje, apenas dois fármacos de terapia angiogênica foram aprovados, um na Rússia e outro no Japão, o que parece um número muito pequeno diante do grande número de investimentos feitos por meio de estudos pré-clínicos e clínicos. Afinal, podemos considerar que a terapia angiogênica já é uma realidade?

Palavras-chave: terapia gênica; aterosclerose; doença arterial periférica; isquemia de membro.

Abstract

The concept of angiogenic therapy emerged in the early 1990s, which can be done with genes that encode growth factors to promote the formation of new vessels and the remodeling of collateral vessels. As the procedure of this therapy usually consists of only local injections of vectors, this process is little invasive, quick and simple to perform. However, since the first clinical evidence of the effect of gene therapy with VEGF seen in patients with the peripheral artery disease to date only two angiogenic therapy drugs have been approved, one in Russia and another in Japan, which seems a very small number in view of a large number of investments made through pre-clinical and clinical studies. After all, can we consider that angiogenic therapy is already a reality?

Keywords: gene therapy; atherosclerosis; peripheral artery disease; limb ischemia.

Como citar: Han SW, Vergani Junior CA, Reis PEO. Terapia gênica de isquemia de membro é uma realidade? J Vasc Bras. 2020;19:e20190059. <https://doi.org/10.1590/1677-5449.190059>

¹ Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, Departamento de Biofísica, Escola Paulista de Medicina, São Paulo, SP, Brasil.

² Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, Centro Interdisciplinar de Terapia Gênica – CINTERGEN, São Paulo, SP, Brasil.

³ Universidade Federal Fluminense – UFF, Departamento de Cirurgia Geral e Especializada, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Fonte de financiamento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) 2015/20206-8.

Conflito de interesse: Os autores declararam não haver conflitos de interesse que precisam ser informados.

Submetido em: Maio 22, 2019. Aceito em: Dezembro 15, 2019.

O estudo foi realizado na Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo, SP, Brasil.

■ INTRODUÇÃO

Os casos de doença arterial obstrutiva periférica (DAOP) aumentam significativamente em indivíduos com mais de 70 anos de idade e com diabetes^{1,2}. Com a população mundial cada vez mais velha e apresentando maus hábitos adquiridos com a vida moderna, como sedentarismo e alimentação inadequada, a prevalência de diabetes e de obesidade mórbida também aumentou, promovendo ainda mais o aumento de pacientes com DAOP. É uma doença silenciosa na fase inicial; portanto, sua descoberta ocorre quando o quadro patológico está bem avançado, o que dificulta a prevenção e o tratamento também. O principal sintoma no início da evolução da DAOP é a dor durante a deambulação, o que caracteriza a claudicação intermitente. Conforme progride, a doença evolui para dor mesmo em repouso, mais proeminente à noite, e úlceras nos membros inferiores que não cicatrizam facilmente; esses sintomas são consequências de diminuição progressiva da perfusão tecidual e são características de isquemia crítica de membros inferiores (ICMI)³.

A principal causa da DAOP é a aterosclerose, que pode afetar artérias de todo o corpo. Por isso, está associada a outras doenças arteriais obstrutivas (coronariana, cerebral e carotídea) e, conseqüentemente, o risco de eventos cardiovasculares como o derrame cerebral e o infarto do miocárdio aumenta em cerca de 6% por ano em pacientes com DAOP⁴. De acordo com o *Transatlantic Inter-Society Consensus*², aproximadamente 30% dos pacientes com ICMI sofrerão amputação, porque os tratamentos de revascularização e clínico não são factíveis para essa população, e 25% desta morrerá dentro de um ano. A evolução de cada paciente é variável e o estágio da doença é sintoma-dependente; portanto, o prognóstico é variável de acordo com cada caso. Pacientes portadores de DAOP com mais de 50 anos têm um prognóstico pior dentro de 5 anos: aproximadamente 10% sofrerão amputação de membros e outros 10-15% deverão morrer em decorrência de doenças cardiovasculares. Em resumo, esse conjunto de dados indica um prognóstico pior para a sociedade moderna, que envelhece cada vez mais com hábitos não saudáveis.

Como aterosclerose é a principal causa da DAOP e das doenças cardiovasculares, os tratamentos clínicos dessas doenças são similares aos usados nos pacientes com isquemia cardiovascular, como o uso de medicamentos para a redução de lipídios, o controle de hipertensão, o uso de agentes que evitam a agregação plaquetária e o controle de glicemia para os pacientes diabéticos com DAOP⁵. Para claudicação intermitente (um dos principais sintomas iniciais da doença que pode evoluir para ICMI), o medicamento

mais utilizado é o cilostazol, que é o inibidor de fosfodiesterase tipo III e atua como antiplaquetário e vasodilatador⁶. Entretanto, a farmacoterapia que atua no endotélio para vasodilatação, angiogênese e remodelamento de vasos a fim de melhorar a função vascular desses pacientes tem trazido pouco benefício porque, provavelmente, as artérias desses pacientes já estão no ambiente de aterosclerose, fibrose e calcificação que dificulta a interação adequada entre fármacos e seus receptores.

Atualmente, os procedimentos mais usados para tratar ICMI são a cirurgia de revascularização e a angioplastia percutânea. Entretanto, como os pacientes com ICMI são, em geral, idosos, fumantes e diabéticos, aproximadamente 30% desses pacientes não podem ser submetidos ao procedimento vascular apesar de todos os avanços nessa área, sendo a amputação muitas vezes a única opção. Somente nos Estados Unidos, estima-se que ocorram entre 120 e 500 amputações de membros inferiores por milhão de habitantes por ano². Gastos para tratamentos de doenças arteriais periféricas nos Estados Unidos chegaram a mais que 4 bilhões de dólares em 2001⁶, e esse valor deve aumentar a cada ano devido ao aumento de fatores de risco como diabetes, obesidade e aumento da expectativa de vida.

Diante da projeção de um aumento contínuo de pacientes com DAOP e das limitações de opções terapêuticas convencionais, seja cirurgia aberta por *bypass* ou angioplastias com balão de angioplastia e stent para revascularização do membro, a terapia gênica com genes que expressam os fatores de crescimento surgiu como uma solução desses problemas no início da década de 90. Esta revisão sumariza os ensaios clínicos de terapia gênica para isquemia de membro e coloca opiniões sobre o futuro de terapia angiogênica sob o olhar dos autores.

■ CONCEITO DE TERAPIA ANGIOGÊNICA COM GENES, CÉLULAS E PROTEÍNAS

A nova aposta de tratar doenças isquêmicas é a utilização de fatores de crescimento para promover a formação de novos vasos e/ou o remodelamento de vasos pouco funcionais. Esses fatores, que são de natureza proteica, podem ser administrados na forma proteica, gênica ou via células que expressam esses fatores; essa modalidade terapêutica é conhecida por angiogênese terapêutica⁷. Em relação a cirurgias, a angiogênese terapêutica é muito menos invasiva e de execução mais simples, sendo geralmente é feita por meio de uma simples injeção no tecido alvo. Além disso, como os princípios ativos são fatores de crescimento, suas ações são específicas somente nas células que

expressam seus receptores; conseqüentemente, as terapias gênica e proteica deveriam provocar menos efeitos secundários que a terapia celular, porque esta última produz um grande número de fatores. As principais características de cada terapia estão mostradas na Tabela 1.

O conceito de tratar doenças com genes surgiu no final da década de 1960, quando a biologia sintética se tornou realidade com a descoberta da estrutura de DNA, dos códigos genéticos e das enzimas para engenharia genética, entre outros⁸. Entretanto, o primeiro ensaio clínico de terapia gênica ocorreu somente em 1990, nos EUA, após aprovação do protocolo pelo órgão federal *Food and Drug Administration* (FDA), o qual foi realizado para tratamento de duas pacientes com *severe combined immunodeficiency* causada pela deficiência de *adenosine deaminase* (SCID-ADA)⁹. Desde esse ensaio clínico, 2.597 ensaios já foram aprovados até 2019 no mundo, segundo o site¹⁰.

A terapia gênica é realizada por meio da transferência de um vetor com gene terapêutico ao paciente, que pode ser feita diretamente ao paciente (terapia gênica *in vivo*) ou com as células modificadas geneticamente (terapia gênica *ex vivo*). A maioria das terapias gênicas clínicas para DAOP têm sido feitas *in vivo* usando os vetores de plasmídeo (pDNA) ou de adenovírus (Ad), porque estes têm uma boa capacidade de transfecção (vetor não viral) ou transdução (vetor viral) *in vivo*. Os vetores Ad são mais eficazes que os pDNA para transferência gênica, mas, como as proteínas capsídicas são muito imunogênicas, a resposta imune anterior precisa ser controlada para aplicações repetidas¹¹. Outra desvantagem do uso de Ad é a maior complexidade da produção dos vetores e do controle de qualidade, que gera alto custo em relação ao pDNA. Por outro lado, o uso de pDNA para terapia gênica requer maior quantidade deste ou um carreador (por exemplo, lipossoma) para compensar a baixa eficiência da transferência gênica *in vivo*, mas, como esse vetor é considerado bem menos imunogênico e mais estável que vetores virais, há um bom número de estudos clínicos usando pDNA¹⁰.

■ ESTUDOS CLÍNICOS DE TERAPIA GÊNICA PARA ISQUEMIA DE MEMBRO

Estudos clínicos de terapia angiogênica realizados até hoje têm usado apenas um único gene por vez para promover a formação de novos vasos a partir dos vasos pré-existentes por brotamento (angiogênese) e/ou a partir de células precursoras endoteliais (vasculogênese) e/ou remodelamento de vasos colaterais (arteriogênese) (Figura 1)¹². O procedimento de terapia gênica é bastante simples, consistindo em injeção intramuscular de vetores (Figura 2), mas a tecnologia para criação e produção desses vetores, que visam alterar um estado tecidual funcionalmente desorganizado e patológico, é complexa.

Entre os genes mais usados para terapia angiogênica nos estudos clínicos estão os genes do fator de crescimento de endotélio vascular (VEGF)¹³, do fator de crescimento de fibroblasto (FGF)¹⁴, do fator de crescimento de hepatócitos (HGF)¹⁵ e do fator induzível por hipóxia (HIF-1 α)^{16,17}. Os detalhes desses fatores e os estudos clínicos com esses genes são descritos abaixo.

HIF-1 α (*hypoxia inducible factor -1 α* , fator induzível por hipóxia 1 α): esse fator é codificado pelo gene HIF-1 α humano constitutivamente e se localiza no citosol. Em condições de normóxia, esse fator é degradado via ubiquitinação, mas sob hipóxia se transloca para o núcleo e se associa ao HIF-1 β e a outros fatores acessórios para formar um complexo proteico que atua na transcrição de mais de 60 genes. Em geral, esses genes estão ligados à angiogênese (por exemplo, o gene do VEGF), eritropoese, neoglicogênese e vasodilatação, cujas atividades são intimamente ligadas à sobrevivência sob hipóxia¹⁸.

O uso desse gene foi testado num estudo clínico denominado WALK em pacientes com DAOP e claudicação intermitente¹⁶. Para esse estudo, 289 pacientes receberam 20 injeções do vetor adenoviral Ad2/HIF-1 α /VP16 nos músculos afetados por isquemia. Esses pacientes foram monitorados durante 12 meses, observando-se a mudança de caminhada. Foi um estudo de duplo-cego e randomizado. O pico mediano

Tabela 1. Comparação entre as terapias angiogênicas.

| | Terapia proteica ¹ (TP) | Terapia celular ² (TC) | Terapia gênica ³ (TG) |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Complexidade da produção | +++ | + / ++ | +++ |
| Custo de produção | ++ / +++ | + / ++ | ++/+++ |
| Estabilidade do fármaco | + | + | ++ / +++ |
| Aplicabilidade entre diferentes pacientes | Sim | Não | Sim |
| Durabilidade do efeito terapêutico | + | + / ++ | ++ / +++ |
| Imunogenicidade | - / + | - / + | + (pDNA, AAV, RV, LV); +++ (AdV) |

¹terapia com proteínas humanas; ²terapia com células autólogas; ³terapia com genes humanos; pDNA (vetor plasmidial); AAV (vetor do vírus adeno-associado); RV (vetor retroviral); LV (vetor lentiviral); AdV (vetor adenoviral). Os sinais representam a intensidade processual entre os parâmetros analisados: muito (+++), médio (++) , pouco (+) ou nada (-).




Figura 1. Ilustração de formação e remodelamento de vasos na fase adulta. Angiogênese, vasculogênese e arteriogênese são processos que levam à formação e ao remodelamento de vasos na fase adulta (os detalhes desses processos estão no texto). EPC: célula progenitora endotelial.




Figura 2. Ilustração de terapia gênica com genes de fator de crescimento para isquemia crítica de membro.

do tempo de caminhada foi de 0,82 minutos no grupo placebo e de 0,82 minutos, 0,28 minutos e 0,78 minutos para os grupos que receberam 2×10^9 , 2×10^{10} e 2×10^{11} de doses do Ad2/HIF-1 α /VP16, respectivamente. Não houve diferença significativa no índice de tornozelo-braquial (ITB) e na qualidade de vida entre os grupos tratados com placebo e os grupos tratados com o vetor Ad2/HIF-1 α /VP16. Assim, os autores concluíram que a terapia gênica desse estudo não foi efetiva no tratamento de pacientes com claudicação intermitente.

FGF-1 (*fibroblast growth factor-1*, fator de crescimento de fibroblasto-1); também conhecido por aFGF (FGF ácido), faz parte da família de FGF, a qual atua em várias atividades biológicas como proliferação e migração da célula endotelial, angiogênese, sobrevivência celular, morfogênese e reparo tecidual, entre outras. Várias atividades ligadas à angiogênese observadas *in vitro* e *in vivo* levaram ao uso do FGF nos pacientes para testes^{19,20}. Entre os ensaios clínicos com esse fator de crescimento, os conduzidos com o vetor *non-viral* 1 FGF-1 (NV1FGF) são provavelmente os mais conhecidos. O NV1FGF

é um vetor de plasmídeo para expressão de FGF-1 que foi desenhado e produzido por Sanofi-Aventis. Apesar de ser um vetor não integrativo, a expressão de FGF1 tem persistido no músculo por várias semanas em alguns pacientes²¹.

Os resultados dos estudos clínicos de fase I²² e II²³ atingiram os objetivos propostos satisfatoriamente, o que permitiu avançar para a fase III²⁴. O estudo de fase III, conhecido por TAMARIS, foi um estudo multicêntrico realizado em 171 centros de 30 países, duplo-cego e randomizado. Os 525 pacientes que participaram desse estudo estavam com a condição clínica inadequada para revascularização e com úlcera isquêmica ou gangrena. Os parâmetros hemodinâmicos para inclusão no estudo foram pressão do tornozelo < 70 mmHg e/ou do dedo < 50 mmHg, ou pressão de oxigênio transcutânea < 30 mmHg. O principal objetivo desse estudo foi mostrar o benefício clínico do NV1FGF em retardar o tempo de amputação maior ou a morte dos pacientes com isquemia de membro e úlcera não cicatrizante cuja revascularização não era possível. Esses pacientes receberam oito injeções intramusculares de 0,5 mg de NV1FGF ou

placebo com um intervalo aproximado de 2 semanas. Os números de amputação ou morte entre os grupos tratados com NV1FGF e placebo não foram diferentes estatisticamente, ou seja, o efeito terapêutico do NV1FGF não foi evidenciado.

HGF (*hepatocyte growth factor*, fator de crescimento de hepatócitos): é outro fator pleiotrópico que atua em diversas atividades fisiológicas como proliferação celular, angiogênese, morfogênese e motilidade²⁵. As células endoteliais e musculares lisas expressam o receptor de HGF, cMet, e são as principais células ligadas à angiogênese²⁶. Injeção intramuscular do pDNA expressando HGF nos animais tem evidenciado a atividade angiogênica, o que motivou os primeiros estudos clínicos de terapia gênica. Morishita et al. realizaram o estudo clínico de fase I/IIa com 22 pacientes com doença arterial periférica ou doença de Buerger nos estágios Fontaine Iib a IV com quatro ou oito injeções de pDNA expressando HGF (2 mg em quatro locais ou 4 mg em oito locais) nos dias 1 e 28. Aumento de ITB, diminuição de úlcera e dor foram os principais resultados que motivaram a continuidade desse estudo²⁷. O estudo de fase III, randomizado, duplo-cego e placebo-controlado foi realizado com 44 pacientes²⁸. Os objetivos primários foram o melhoramento de dor em repouso ou a redução de úlcera nos pacientes com úlceras, e os objetivos secundários foram a melhora do ITB, da taxa de amputação e da qualidade de vida. Houve melhora significativa dos objetivos primários e da qualidade de vida sem efeitos negativos significativos, mas a taxa de amputação e o ITB não sofreram melhora. Este medicamento de terapia gênica, Collatogene, recebeu aprovação condicional no Japão em 2019.

O BM202 é um vetor de plasmídeo que expressa duas isoformas de HGF²⁹. Curioso é que a expressão das duas isoformas levou a uma melhora significativa do ITB, o que não foi visto no estudo do Shigematsu et al.²⁸. Baseado nesse estudo, um estudo de fase II foi aprovado e está em andamento.

VEGF (*vascular endothelial growth factor*, fator de crescimento endotelial vascular): é o fator de crescimento mais estudado para fins de terapia angiogênica. Há quatro principais isoformas (VEGF A, B, C e D), e o *splicing* alternativo, que é um processo de remoção alternativa de íntrons e de junção de éxons para formar um novo mRNA, leva à formação de mais isoformas. O VEGF A humano pode formar VEGF121, VEGF165, VEGF189 e VEGF206, sendo que as duas primeiras isoformas são as mais usadas para terapia gênica. Recentemente foi visto que as formas nativas ou modificadas da isoforma VEGF D, que atua em linfangiogênese, também podem promover angiogênese ativamente^{30,31}. Os receptores de VEGF são Flt-1,

Flk-1, que também são denominados de VEGFR-1 e VEGFR-2, respectivamente. O VEGFR-1 se liga a VEGF A e B, enquanto que o VEGFR-2 se liga a apenas VEGF A³². Os VEGFRs atuam junto com a neutrofilina-1, que é considerada a correceptora do VEGF. Nas células endoteliais, os VEGFR-1 e VEGFR-2 estão presentes.

O trabalho pioneiro de terapia angiogênica foi iniciado em 1994 por Jeffrey Isner e seu grupo, em que a formação de vasos pode ser estimulada com a aplicação de um vetor de plasmídeo com VEGF165 (phVEGF165) na ponta de um cateter de hidrogel³³. Anos depois, o mesmo grupo realizou outro estudo clínico aplicando phVEGF165 diretamente nos membros isquêmicos dos pacientes com DAOP. Nesse estudo, foram realizadas duas aplicações de 2 mg de phVEGF165 com um intervalo de 2 semanas³⁴. O índice médio do ITB aumentou significativamente e a formação de vasos colaterais foi evidenciada por angiografia com contraste e angiografia de ressonância magnética. Houve melhora significativa da cicatrização de úlceras em vários pacientes. Esse trabalho, além de ter demonstrado a eficácia de terapia angiogênica no tratamento de doenças isquêmicas, revelou que a utilização do vetor de plasmídeo, que é um vetor de desenho e produção simples em relação a outros vetores, e a forma simples de aplicação marcaram a nova era da terapia angiogênica.

Vários estudos clínicos de terapia angiogênica com VEGF têm sido realizados¹⁰. Apesar dos resultados empolgantes verificados inicialmente, outros estudos que vieram posteriormente, com tamanhos de amostras maiores, mostraram resultados controversos. Por exemplo, um estudo de fase II realizado pelo Kusumanto et al.³⁵ aplicando phVEGF165 em 54 pacientes diabéticos com isquemia crítica de membro não conseguiu demonstrar melhora na redução de amputação em 100 dias, apesar de ter demonstrado melhora significativa de dor, cicatrização de úlcera e do ITB em alguns pacientes. Outro estudo de fase II, mas usando o vetor adenoviral VEGF121 (AdVEGF121), foi realizado em 105 pacientes com doença arterial periférica³⁶. O objetivo primário de aumentar o tempo de caminhada em 12 semanas não foi alcançado, e foi observado edema em vários pacientes após a aplicação do vetor. A conclusão do estudo é que uma aplicação intramuscular do vetor AdVEGF121 não estava associada com a melhora de performance de exercício e da qualidade de vida. Esses e outros estudos clínicos de terapia angiogênica com VEGF mostraram resultados controversos de efetividade.

Apesar dessas controvérsias, em 2011 o vetor plasmidial com VEGF165, cujo nome comercial é Neovascular, foi aprovado na Rússia para tratamento

de pacientes com isquemia de membro após um estudo clínico de fase IIb/III com 100 pacientes. Nesse estudo randomizado, os pacientes foram tratados com 1,2 mg do vetor pCMV-vegfl65, duas vezes com intervalo de 14 dias, ou com tratamento convencional para o grupo controle³⁷. A distância de caminhada sem dor aumentou 110,4%, 167,2% e 190,8% após 6 meses, 1 ano e 2 anos de tratamento, respectivamente. Além disso, o ITB e a velocidade do fluxo sanguíneo também tiveram melhoria significativa. Os autores concluem o artigo dizendo que o tratamento com o pCMV-vegfl65 é um método efetivo para o tratamento de claudicação moderada a severa causada por ICMI.

Por que os resultados promissores vistos nos ensaios pré-clínicos não se repetem na mesma proporção nos ensaios clínicos?

Os estudos pré-clínicos de terapia gênica para isquemia de membro, em geral, têm se realizado usando camundongos para testes. A isquemia é induzida cirurgicamente com fechamento da porção distal e proximal da artéria femoral seguido de remoção dessa extensão arterial. Em alguns modelos, as artérias colaterais também são fechadas para induzir isquemia severa³⁸. Com isso, a circulação local se reduz drasticamente a ponto de não se verificar nenhuma pelo *laser Doppler perfusion imaging* (LDPI) logo após cirurgia. Embora a isquemia seja restabelecida rapidamente por esse procedimento, a fisiopatologia dessa isquemia é muito diferente daquela gerada por aterosclerose, a qual é um processo lento que ocorre com acúmulo de gorduras e células na parede da artéria. Portanto, é um modelo muito pouco representativo da doença humana.

Além disso, a linhagem de camundongos mais usada nesses estudos é a C57/Bl6, talvez devido à disponibilidade de uma grande quantidade de informações sobre essa linhagem e ao baixo custo para obtenção e manutenção. No entanto, quando esses estudos são comparados com outros estudos similares realizados com a linhagem Balb/c, observa-se diferença notável no grau de isquemia e nos resultados das terapias empregadas. Hoje se sabe que isso ocorre porque a anatomia vascular entre essas linhagens de camundongo tem uma diferença significativa em decorrência da variação genética³⁹ e porque a linhagem Balb/c é bem mais sensível à isquemia do que a C57/Bl6. Se o grau de isquemia gerada e das respostas da terapia angiogênica entre as linhagens de camundongo tem uma grande diferença, quanto seria essa diferença entre camundongos e pacientes humanos?

O surgimento da DAOP é consequência do jogo entre os fatores de risco, além do fator genético que cada um carrega. Portanto, a variação fisiopatológica

de cada paciente é muito variável, enquanto que no modelo animal essa variação é mínima porque o ambiente foi condicionado para reduzir ao máximo as variações a fim de facilitar a interpretação de resultados. Qual é a chance de uma droga testada com sucesso num modelo animal nessas condições trazer o mesmo benefício aos pacientes com DAOP?

■ PERSPECTIVAS DE TERAPIAS ANGIOGÊNICAS PARA ISQUEMIA DE MEMBRO

Até o momento, apenas dois fármacos de terapia angiogênica foram aprovados: Neovasculgen, foi aprovado na Rússia em 2011, e Collategene no Japão. É importante notar que ambos fármacos são construídos com vetores de plasmídeo carreando os fatores de crescimento que atuam nas células endoteliais para promoção de angiogênese. Como foi comentado anteriormente, os vetores derivados de plasmídeo são apenas moléculas de DNA; portanto, não há perigo de se replicarem no organismo⁴⁰, o que é uma grande vantagem sobre os vetores virais. Além disso, o custo para produção e controle de qualidade é mais simples e menos custoso que o dos vetores virais.

Entretanto, a efetividade desses fármacos ainda é questionável, porque há controvérsias nos resultados de ensaios clínicos. A formação de vasos é um processo complexo que envolve multiplicação e diferenciação de células precursoras sob o controle de várias moléculas regulatórias⁴¹. Assim, o uso de um único fator que atua especificamente em células endoteliais talvez não seja suficiente para formar um vaso maduro num ambiente isquêmico e inflamado.

A terapia angiogênica ideal para isquemia de membro seria aquela que consegue atuar em todas ou na maioria das células e moléculas que participam da angiogênese e do controle da inflamação. Abaixo sugerimos algumas formas de alcançar essa terapia ideal.

1. Uso de mais genes angiogênicos: até hoje todos os ensaios clínicos de terapia gênica têm sido realizados utilizando apenas um único gene por vez. Como há vários genes essenciais em angiogênese, o uso de mais de um desses genes poderá trazer melhores efeitos terapêuticos. Na prática, isso é factível usando vetores bi-ou tricistrônicos ou cotransfecção de vários vetores monocistrônicos para expressar vários genes simultaneamente no tecido alvo;
2. Uso de células-tronco modificadas geneticamente: as células-tronco têm plasticidade para se diferenciar em outros tipos celulares e expressam

vários fatores de crescimento pró-angiogênicos. Entre os tipos de células-tronco conhecidos, as células-tronco mesenquimais são as mais adequadas para uso clínico, devido à facilidade de obtenção em grande quantidade da medula óssea e da gordura, e capacidade de promover angiogênese⁴². Entretanto, o direcionamento da diferenciação a um tipo celular e a um tipo de atividade depende principalmente do microambiente onde a célula se encontra. Modificações genéticas com os vetores usados para terapia gênica podem ser usadas para direcionar a diferenciação e a atividade pró-angiogênica e realizar terapia gênica *ex vivo*⁴³;

3. Uso de genes de hematopoese: a hematopoese, a isquemia e a inflamação são processos biológicos intimamente interligados. A isquemia e a inflamação estimulam a hematopoese para produzir mais células sanguíneas, sendo os monócitos e os macrófagos os principais elementos que participam no controle de inflamação e na angiogênese⁴⁴. As subpopulações dos monócitos e macrófagos podem ser classificadas, em função de suas atividades inflamatórias, em pró-inflamatórias e anti-inflamatórias⁴⁵. E essas subpopulações podem promover ou inibir angiogênese e fibrogênese para reparo do tecido isquêmico e inflamado. Os genes que codificam fatores estimuladores de colônia como o fator estimulador de colônias de granulócitos e macrófagos (*granulocyte-macrophage colony-stimulating factor*, GM-CSF), o fator estimulador de colônias granulocitárias (*granulocyte colony-stimulating factor*, G-CSF) e o fator estimulante de colônias de macrófagos (*macrophage colony-stimulating factor*, M-CSF) e interleucinas como IL4 e IL13 participam no direcionamento e na ampliação dessas subpopulações de monócitos e macrófagos. Logo, o uso adequado desses genes poderá levar à formação e ao remodelamento de vasos de forma mais eficiente no ambiente isquêmico e inflamado^{46,47}.

Em resumo, pode-se afirmar que a terapia gênica para isquemia de membro já é uma realidade clínica, visto que dois fármacos de terapia gênica já estão disponíveis no mercado. A eficácia dos fármacos vistos nesta revisão ainda é questionável, mas o importante é que o histórico de terapia gênica mostra que as pesquisas científicas e tecnológicas estão vencendo as barreiras de desconhecimentos e estão permitindo a criação de novos fármacos mais eficazes e seguros com materiais genéticos naturais ou sintéticos em

associação com nanocarreadores ou vírus modificados geneticamente. No Brasil, a regulamentação de terapias avançadas, que inclui a terapia gênica, a terapia celular e a engenharia tecidual, foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) neste ano⁴⁸. Com isso, os fármacos de terapia gênica já aprovados ou em fase de testes clínicos no exterior poderão ser comercializados ou testados no Brasil. Diante desse cenário, é importante que a medicina brasileira esteja preparada para usufruir dessa tecnologia e dos produtos por meio de atualizações.

■ REFERÊNCIAS

1. Fowkes FG, Rudan D, Rudan I, et al. Comparison of global estimates of prevalence and risk factors for peripheral artery disease in 2000 and 2010: a systematic review and analysis. *Lancet*. 2013;2013(382):1329-40. [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)61249-0](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61249-0). PMID:23915883.
2. Norgren L, Hiatt WR, Dormandy JA, Nehler MR, Harris KA, Fowkes FGR. Inter-society consensus for the management of peripheral arterial disease (TASC II). *J Vasc Surg*. 2007;45(1 Suppl):S5-67. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jvs.2006.12.037>.
3. Stoyioglou A, Jaff MR. Medical treatment of peripheral arterial disease: a comprehensive review. *J Vasc Interv Radiol*. 2004;2004(15):1197-207. <http://dx.doi.org/10.1097/01.RVI.00001337978.15352.C6>. PMID:15525738.
4. Criqui MH, Langer RD, Fronek A, et al. Mortality over a period of 10 years in patients with peripheral arterial disease. *N Engl J Med*. 1992;1992(326):381-6. <http://dx.doi.org/10.1056/NEJM199202063260605>. PMID:1729621.
5. McCann AB, Jaff MR. Treatment strategies for peripheral artery disease. *Expert Opin Pharmacother*. 2009;2009(10):1571-86. <http://dx.doi.org/10.1517/14656560902988502>. PMID:19527186.
6. Hirsch AT, Hartman L, Town RJ, Virnig BA. National health care costs of peripheral arterial disease in the Medicare population. *Vasc Med*. 2008;13(3):209-15. <http://dx.doi.org/10.1177/1358863X08089277>. PMID:18687757.
7. Isner JM. Therapeutic angiogenesis: a new frontier for vascular therapy. *Vasc Med*. 1996;1(1):79-87. <http://dx.doi.org/10.1177/1358863X9600100114>. PMID:9546920.
8. Friedmann T, Roblin R. Gene therapy for human genetic disease? *Science*. 1972;1972(175):949-55. <http://dx.doi.org/10.1126/science.175.4025.949>. PMID:5061866.
9. Blaese RM, Culver KW, Miller AD, et al. T lymphocyte-directed gene therapy for ADA- SCID: initial trial results after 4 years. *Science*. 1995;1995(270):475-80. <http://dx.doi.org/10.1126/science.270.5235.475>. PMID:7570001.
10. Abedia. [site on the Internet]. United Kingdom: John Wiley and Sons Ltd; 2019. [cited 2019 may 22]. <http://www.abedia.com/wiley/>.
11. Schirmbeck R, Reimann J, Kochanek S, Kreppel F. The immunogenicity of adenovirus vectors limits the multispecificity of CD8 T-cell responses to vector-encoded transgenic antigens. *Mol Ther*. 2008;2008(16):1609-16. <http://dx.doi.org/10.1038/mt.2008.141>. PMID:18612271.
12. Carmeliet P. Mechanisms of angiogenesis and arteriogenesis. *Nat Med*. 2000;6(4):389-95. <http://dx.doi.org/10.1038/74651>. PMID:10742145.

13. Ferrara N, Gerber HP, LeCouter J. The biology of VEGF and its receptors. *Nat Med.* 2003;9(6):669-76. <http://dx.doi.org/10.1038/nm0603-669>. PMID:12778165.
14. Beenen A, Mohammadi M. The FGF family: biology, pathophysiology and therapy. *Nat Rev Drug Discov.* 2009;8(3):235-53. <http://dx.doi.org/10.1038/nrd2792>. PMID:19247306.
15. Morishita R, Aoki M, Hashiya N, et al. Therapeutic angiogenesis using hepatocyte growth factor (HGF). *Curr Gene Ther.* 2004;4(2):199-206. <http://dx.doi.org/10.2174/1566523043346453>. PMID:15180586.
16. Creager MA, Olin JW, Belch JJ, et al. Effect of hypoxia-inducible factor-1alpha gene therapy on walking performance in patients with intermittent claudication. *Circulation.* 2011;2011(124):1765-73. <http://dx.doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.110.009407>. PMID:21947297.
17. Rajagopalan S, Olin J, Deitcher S, et al. Use of a constitutively active hypoxia-inducible factor-1alpha transgene as a therapeutic strategy in no-option critical limb ischemia patients: phase I dose-escalation experience. *Circulation.* 2007;2007(115):1234-43. <http://dx.doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.106.607994>. PMID:17309918.
18. Krock BL, Skuli N, Simon MC. Hypoxia-induced angiogenesis: good and evil. *Genes Cancer.* 2012;2011(2):1117-33. <http://dx.doi.org/10.1177/1947601911423654>. PMID:22866203.
19. Burgess WH, Maciag T. The heparin-binding (fibroblast) growth factor family of proteins. *Annu Rev Biochem.* 1989;1989(58):575-606. <http://dx.doi.org/10.1146/annurev.bi.58.070189.003043>. PMID:2549857.
20. Cao R, Brakenhielm E, Pawliuk R, et al. Angiogenic synergism, vascular stability and improvement of hind-limb ischemia by a combination of PDGF-BB and FGF-2. *Nat Med.* 2003;2003(9):604-13. <http://dx.doi.org/10.1038/nm848>. PMID:12669032.
21. Baumgartner I, Chronos N, Comerota A, et al. Local gene transfer and expression following intramuscular administration of FGF-1 plasmid DNA in patients with critical limb ischemia. *Mol Ther.* 2009;17(5):914-21. <http://dx.doi.org/10.1038/mt.2009.24>. PMID:19240689.
22. Comerota AJ, Throm RC, Miller KA, et al. Naked plasmid DNA encoding fibroblast growth factor type 1 for the treatment of end-stage unreconstructible lower extremity ischemia: preliminary results of a phase I trial. *J Vasc Surg.* 2002;2002(35):930-6. <http://dx.doi.org/10.1067/mva.2002.123677>. PMID:12021709.
23. Nikol S, Baumgartner I, Van Belle E, et al. Therapeutic angiogenesis with intramuscular NV1FGF improves amputation-free survival in patients with critical limb ischemia. *Mol Ther.* 2008;16(5):972-8. <http://dx.doi.org/10.1038/mt.2008.33>.
24. Belch J, Hiatt WR, Baumgartner I, et al. Effect of fibroblast growth factor NV1FGF on amputation and death: a randomised placebo-controlled trial of gene therapy in critical limb ischaemia. *Lancet.* 2011;2011(377):1929-37. [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(11\)60394-2](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60394-2). PMID:21621834.
25. Nakamura T, Mizuno S. The discovery of hepatocyte growth factor (HGF) and its significance for cell biology, life sciences and clinical medicine. *Proc Jpn Acad, Ser B, Phys Biol Sci.* 2010;2010(86):588-610. <http://dx.doi.org/10.2183/pjab.86.588>. PMID:20551596.
26. Kaga T, Kawano H, Sakaguchi M, Nakazawa T, Taniyama Y, Morishita R. Hepatocyte growth factor stimulated angiogenesis without inflammation: differential actions between hepatocyte growth factor, vascular endothelial growth factor and basic fibroblast growth factor. *Vascul Pharmacol.* 2012;2012(57):3-9. <http://dx.doi.org/10.1016/j.vph.2012.02.002>. PMID:22361334.
27. Morishita R, Makino H, Aoki M, et al. Phase I/IIa clinical trial of therapeutic angiogenesis using hepatocyte growth factor gene transfer to treat critical limb ischemia. *Arterioscler Thromb Vasc Biol.* 2010;2011(31):713-20. <http://dx.doi.org/10.1161/ATVBAHA.110.219550>. PMID:21183732.
28. Shigematsu H, Yasuda K, Iwai T, et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial of hepatocyte growth factor plasmid for critical limb ischemia. *Gene Ther.* 2010;2010(17):1152-61. <http://dx.doi.org/10.1038/gt.2010.51>. PMID:20393508.
29. Henry TD, Hirsch AT, Goldman J, et al. Safety of a non-viral plasmid-encoding dual isoforms of hepatocyte growth factor in critical limb ischemia patients: a phase I study. *Gene Ther.* 2011;2011(18):788-94. <http://dx.doi.org/10.1038/gt.2011.21>. PMID:21430785.
30. Hartikainen J, Hassinen I, Hedman A, et al. Adenoviral intramyocardial VEGF-DeltaDeltaC gene transfer increases myocardial perfusion reserve in refractory angina patients: a phase I/IIa study with 1-year follow-up. *Eur Heart J.* 2017;2017(38):2547-55. <http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehx352>. PMID:28903476.
31. Rissanen TT, Markkanen JE, Gruchala M, et al. VEGF-D is the strongest angiogenic and lymphangiogenic effector among VEGFs delivered into skeletal muscle via adenoviruses. *Circ Res.* 2003;2003(92):1098-106. <http://dx.doi.org/10.1161/01.RES.0000073584.46059.E3>. PMID:12714562.
32. Stutfeld E, Ballmer-Hofer K. Structure and function of VEGF receptors. *IUBMB Life.* 2009;2009(61):915-22. <http://dx.doi.org/10.1002/iub.234>. PMID:19658168.
33. Isner JM, Walsh K, Symes J, et al. Arterial gene transfer for therapeutic angiogenesis in patients with peripheral artery disease. *Hum Gene Ther.* 1996;1996(7):959-88. <http://dx.doi.org/10.1089/hum.1996.7.8-959>. PMID:8727509.
34. Baumgartner I, Pieczek A, Manor O, et al. Constitutive expression of phVEGF165 after intramuscular gene transfer promotes collateral vessel development in patients with critical limb ischemia. *Circulation.* 1998;1998(97):1114-23. <http://dx.doi.org/10.1161/01.CIR.97.12.1114>. PMID:9537336.
35. Kusumanto YH, van Weel V, Mulder NH, et al. Treatment with intramuscular vascular endothelial growth factor gene compared with placebo for patients with diabetes mellitus and critical limb ischemia: a double-blind randomized trial. *Hum Gene Ther.* 2006;2006(17):683-91. <http://dx.doi.org/10.1089/hum.2006.17.683>. PMID:16776576.
36. Rajagopalan S, Mohler ER 3rd, Lederman RJ, et al. Regional angiogenesis with vascular endothelial growth factor in peripheral arterial disease: a phase II randomized, double-blind, controlled study of adenoviral delivery of vascular endothelial growth factor 121 in patients with disabling intermittent claudication. *Circulation.* 2003;2003(108):1933-8. <http://dx.doi.org/10.1161/01.CIR.0000093398.16124.29>. PMID:14504183.
37. Deev RV, Bozo IY, Mzhavanadze ND, et al. pCMV-vegf165 intramuscular gene transfer is an effective method of treatment for patients with chronic lower limb ischemia. *J Cardiovasc Pharmacol Ther.* 2015;2015(20):473-82. <http://dx.doi.org/10.1177/1074248415574336>. PMID:25770117.
38. Martins L, Martin PK, Han SW. Angiogenic properties of mesenchymal stem cells in a mouse model of limb ischemia. *Methods Mol Biol.* 2014;1213:147-69. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-1453-1_13. PMID:25173381.
39. Dokun AO, Keum S, Hazarika S, et al. A quantitative trait locus (LSq-1) on mouse chromosome 7 is linked to the absence of tissue loss after surgical hindlimb ischemia. *Circulation.* 2008;117(9):1207-15. <http://dx.doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.107.736447>. PMID:18285563.
40. del Solar G, Giraldo R, Ruiz-Echevarria MJ, Espinosa M, Diaz-Orejas R. Replication and control of circular bacterial plasmids. *Microbiol*

- Mol Biol Rev. 1998;62(2):434-64. <http://dx.doi.org/10.1128/MMBR.62.2.434-464.1998>. PMID:9618448.
41. Yoshida WB. Angiogenesis, arteriogenesis and vasculogenesis: treatment of the future for lower limb critical ischemia? J Vasc Bras. 2005;4(4):316-8. <http://dx.doi.org/10.1590/S1677-54492005000400002>.
42. Kim Y, Kim H, Cho H, Bae Y, Suh K, Jung J. Direct comparison of human mesenchymal stem cells derived from adipose tissues and bone marrow in mediating neovascularization in response to vascular ischemia. Cell Physiol Biochem. 2007;20(6):867-76. <http://dx.doi.org/10.1159/000110447>. PMID:17982269.
43. Cunha FF, Martins L, Martin PKM, Stilhano RS, Paredes Gamero EJ, Han SW. Comparison of treatments of peripheral arterial disease with mesenchymal stromal cells and mesenchymal stromal cells modified with granulocyte and macrophage colony-stimulating factor. Cytotherapy. 2013;15(7):820-9. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jcyt.2013.02.014>. PMID:23660332.
44. Mantovani A, Biswas SK, Galdiero MR, Sica A, Locati M. Macrophage plasticity and polarization in tissue repair and remodelling. J Pathol. 2013;229(2):176-85. <http://dx.doi.org/10.1002/path.4133>. PMID:23096265.
45. Mantovani A, Sica A, Sozzani S, Allavena P, Vecchi A, Locati M. The chemokine system in diverse forms of macrophage activation and polarization. Trends Immunol. 2004;25(12):677-86. <http://dx.doi.org/10.1016/j.it.2004.09.015>. PMID:15530839.
46. Sacramento CB, Cantagalli VD, Grings M, et al. Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor gene based therapy for acute limb ischemia in a mouse model. J Gene Med. 2009;11(4):345-53. <http://dx.doi.org/10.1002/jgm.1298>. PMID:19194978.
47. Sacramento CB, Silva FH, Nardi NB, et al. Synergistic effect of vascular endothelial growth factor and granulocyte colony-stimulating factor double gene therapy in mouse limb ischemia. J Gene Med. 2010;12(3):310-9. <http://dx.doi.org/10.1002/jgm.1434>. PMID:20077434.
48. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Terapias avançadas. Brasília: ANVISA; 2019. [cited 2019 may 22]. <http://portal.anvisa.gov.br/terapias-avancadas>

Correspondência

Sang Won Han
 Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, Escola Paulista de
 Medicina, Departamento de Biofísica
 Rua Mirassol, 207
 CEP 04044-010 - São Paulo (SP), Brasil
 Tel.: (11) 5576-4848, ramal 3090
 E-mail: sang.han@unifesp.br, universo.han@gmail.com

Informações sobre os autores

SWH - doutor em bioquímica pela Universidade de São Paulo (USP).
 CAVJ - bacharel em biomedicina pela Universidade Federal de São
 Paulo (UNIFESP).
 PEOR - doutor em ciências morfológicas pela Universidade Federal
 de Rio de Janeiro (UFRJ).

Contribuição dos autores

Concepção e desenho do estudo: SWH, CAVJ, PEOR
 Análise e interpretação dos dados: SWH, CAVJ, PEOR
 Coleta de dados: SWH, CAVJ, PEOR
 Redação do artigo: SWH, CAVJ, PEOR
 Revisão crítica do texto: SWH, CAVJ, PEOR
 Aprovação final do artigo*: SWH, CAVJ, PEOR
 Análise estatística: N/A.
 Responsabilidade geral pelo estudo: SWH

*Todos os autores leram e aprovaram a versão final submetida do
 J Vasc Bras.