




Since January 2020 Elsevier has created a COVID-19 resource centre with free information in English and Mandarin on the novel coronavirus COVID-19. The COVID-19 resource centre is hosted on Elsevier Connect, the company's public news and information website.

Elsevier hereby grants permission to make all its COVID-19-related research that is available on the COVID-19 resource centre - including this research content - immediately available in PubMed Central and other publicly funded repositories, such as the WHO COVID database with rights for unrestricted research re-use and analyses in any form or by any means with acknowledgement of the original source. These permissions are granted for free by Elsevier for as long as the COVID-19 resource centre remains active.



Carta al Director

Síndrome pierde sal cerebral asociado a ingesta de dióxido de cloro utilizado para la prevención de infección por SARS-CoV-2

Cerebral salt-wasting syndrome associated with ingestion of chlorine dioxide used to prevent SARS-CoV-2 infection

Sr. Director:

La pandemia del SARS-CoV-2 ha supuesto la crisis sanitaria, social y económica más devastadora de los últimos años a nivel mundial. Durante la misma se han promocionado productos para la prevención y tratamiento frente al citado coronavirus. Algunos de estos productos incluyen dióxido de cloro o clorito de sodio, también conocido como Miracle Mineral Solution (MMS)¹.

El dióxido de cloro es un potente agente oxidante que se disocia rápidamente en los tejidos biológicos produciendo su agente activo, el clorito de sodio².

Actualmente no existe evidencia científica que acrechte seguridad o eficacia en el empleo de dicha sustancia y sus derivados contra el SARS-CoV-2. Asimismo, desde el 2010 diferentes autoridades sanitarias, como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) o la Therapeutic Good Administration (TGA), han alertado de los severos efectos secundarios relacionados con su consumo^{3,4}.

A continuación, presentamos el primer caso descrito en la literatura de un síndrome pierde sal cerebral que se manifestó con hiponatremia severa como reacción adversa al consumo de dióxido de cloro.

Se trata de un varón de 61 años sin antecedentes personales, y no vacunado frente al SARS-CoV-2, que comenzó a consumir por voluntad propia de forma diaria dióxido de cloro con la creencia de prevenir la infección. A las 2 semanas presentó cuadro encefalopático de instauración progresiva con bradipsiquia, desrealización, irritabilidad e inquietud. A la exploración física se evidenció deshidratación cutáneo-mucosa. Se realizó tomografía computarizada (TC) craneal que reveló edema cerebral e hipertensión intracranial idiopática.



Figura 1 – Corte axial tomografía computarizada craneal: edema cerebral e hipertensión intracranial idiopática.

(fig. 1). Se realizaron fondo de ojo y punción lumbar resultando normales. En analítica sanguínea se objetivó: sodio 112 mEq/l, cloro 77 mEq/l, osmolaridad plasmática 230 mOsm/kg y ácido úrico 2,2 mg/dl, excreción fraccionada de úrico (FEUa) al ingreso: 15,4% y tras 72 h con normalización de la natremia, FEUa: 11,4%. En gasometría venosa se objetivó pH 7,42, bicarbonato (HCO₃) 21 mmol/l, CO₂ 42 mmHg. Resto sin hallazgos a destacar. En análisis urinario: sodio 72 mEq/l, potasio 30 mEq/l, cloro 55 mEq/l, ácido úrico 15,4 mg/dl y osmolaridad 224 mOsm/kg. Se retiró de forma inmediata el dióxido de cloro

Tabla 1 – Evolución de parámetros analíticos

	Al ingreso		Tras 20 h		Tras 72 h	
	Plasma	Orina	Plasma	Orina	Plasma	Orina
Glucosa, mg/dl	103	0	81	1	80	2
Urea, mg/dl	21	526	15	221	22	647
Creatinina, mg/dl	0,77	35	0,69	14	0,95	50
Ácido úrico, mg/dl	2,2	15,4	2,3	7	3	18
Sodio, mEq/l	112	72	119	67	135	102
Potasio, mEq/l	4,4	30	3,7	7	3,8	13
Cloro, mEq/l	77	55	88	69	98	101
Osmolaridad, mOsm/kg	230	222	260	164	263	301
FEUa, %	15,4		15		11,4	
pH	7,42	6	7,37	6,5	7,36	7,5
HCO ₃ , mmol/l	21		25,3		24,7	
PCO ₂ , mmHg	42		50		46	
Anión GAP, mEq/l	18,4	47	9,4	5	11,1	14

FEUa: excreción fraccionada de úrico; HCO₃: bicarbonato; pCO₂, presión parcial de dióxido de carbono, pH: potencial de hidrógeno.

iniciándose tratamiento para reposición hidroelectrolítica según déficit de sodio progresivamente, con restablecimiento paulatino del estado neurológico y normalización de parámetros analíticos (**tabla 1**). Se realizó un diagnóstico diferencial de otras posibles causas de hiponatremia.

El consumo de dióxido de cloro ha aumentado de forma exponencial durante la pandemia debido a la divulgación de información errónea en medios de comunicación y redes sociales sobre su posible efecto profiláctico en el desarrollo de una infección por SARS-CoV-2. Las reacciones adversas más frecuentes del mismo son insuficiencia respiratoria, alteraciones del ritmo cardíaco, insuficiencia hepática aguda, hipotensión, alteraciones gastrointestinales o lesión renal aguda^{5,6}. Se han descrito cuadros digestivos graves vinculados al consumo de esta sustancia que podrían causar hiponatremia secundaria a la situación de pérdidas del paciente. Hasta el momento, en la literatura no se ha comunicado la aparición de un síndrome pierde sal cerebral tras la ingesta de esta sustancia.

En el caso descrito se estable como diagnóstico de presunción un síndrome pierde sal cerebral, caracterizado por hiponatremia (sodio plasmático inferior a 135 mEq/l), hipotónica (osmolaridad plasmática <280 mOsm/kg), hipovolémica (presencia de signos de deshidratación), con pérdidas renales de sodio con sodio urinario >40 mEq/l y osmolaridad urinaria alta (>100 mOsm/kg) acompañada de hipouricemia (ácido úrico inferior a 4 mg/dl) y una excreción fraccional de ácido úrico (FEUa) elevada (>10-12%). La severidad del cuadro se encontraba determinada por la aparición de clínica neurológica de instauración lenta y progresiva, siendo descartada organicidad encefálica mediante prueba de imagen y punción lumbar. Por lo tanto, los datos clínicos y analíticos expuestos, la ausencia de tratamiento diurético y los niveles plasmáticos dentro de la normalidad de urea, creatinina, cortisol y aldosterona sugieren el diagnóstico de síndrome pierde sal cerebral⁷.

La patogenia del mismo es poco conocida y suele ser transitorio con resolución completa en semanas, resultando fundamental el diagnóstico diferencial con el síndrome de secreción inadecuada de ADH (SIADH)⁸. La FEUa ayuda en el diagnóstico diferencial del síndrome pierde sal con el SIADH, puesto que en el síndrome pierde sal, como ocurre en nuestro

caso, la FEUa es mayor del 11% y no se corrige tras la normalización de la natremia⁹.

Aplicando el algoritmo de causalidad del Sistema Español del Farmacovigilancia (SEF) en este caso, es probable que el cuadro se trate de una reacción adversa relacionada con el dióxido de cloro al existir una secuencia temporal evidente entre su ingesta y la aparición de la clínica, así como una resolución completa del mismo al suspender el agente, aunque actualmente se desconoce el motivo por el cual el dióxido de cloro puede causar hiponatremia, debido a que su agente activo es el dióxido de sodio, podría postularse como teoría una reacción renal al exceso del agente activo, clorito de sodio, que provoque un aumento de pérdidas urinarias de sodio, que mantenido en el tiempo derivan en una hiponatremia establecida de forma subaguda como ocurre en el caso descrito.

Consideramos relevante el caso descrito ante la necesidad de concienciar a la población de los diversos efectos adversos relacionados con esta sustancia, y la nula evidencia que acredite el empleo de la misma en la prevención de infección SARS-CoV-2, evitando así su consumo.

Financiación

No se ha recibido financiación por ninguna entidad financidora.

BIBLIOGRAFÍA

1. Burela A, Hernández-Vásquez A, Comandé D, Peralta V, Fiestas F. Chlorine dioxide and chlorine derivatives for the prevention or treatment of COVID-19: A systematic review. Rev Perú Med Exp Salud Pública. 2020;37:605-10.
2. Wei M, Lai J, Zhan P. Action modes of chlorine dioxide—a review. Wei Sheng Wu Xue Bao. 2012;52:429–34.
3. NewsCAP:. FDA warns consumers about the dangerous and potentially life threatening side effects of Miracle Mineral Solution. Am J Nurs. 2019;119:14.
4. FDA. (2020). Coronavirus (COVID-19) update: FDA warns seller marketing dangerous chlorine dioxide products that claim to treat or prevent COVID-19. [consultado Jun 2022] Disponible en: <https://www.fda.gov/news-events/press>

- announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-warns-seller-marketing-dangerous-chlorine-dioxide-products-claim.
5. Medina-Avitia E, Tella-Vega P, García-Estrada C. Acute kidney injury secondary to chlorine dioxide use for COVID-19 prevention. *Hemodial Int.* 2021;25:40-3.
 6. Arellano-Gutiérrez G, Aldana-Zaragoza EH, Pérez-Fabián A. Intestinal perforation associated with chlorine dioxide ingestion: An adult chronic consumer during COVID-19 pandemic. *Clin J Gastroenterol.* 2021;14:1655-60.
 7. Spasovski G, Vanholder R, Allolio B, Annane D, Ball S, Bichet D, et al. Clinical practice guideline on diagnosis and treatment of hyponatraemia. *Nephrol Dial Transplant.* 2014;40:924.
 8. Singh S, Bohn D, Carlotti AP, Cusiamo M, Rutka JT, Halperin ML. Cerebral salt wasting: Truths, fallacies, theories, and challenges. *Crit Care Med.* 2002;30:2575-9.
 9. Sterns RH, Silver SM. Cerebral salt wasting versus SIADH: What difference? *J Am Soc Nephrol.* 2008;19:194-6.

Elena Hernández García *, Vanesa García Chumillas, Juan de Dios López-González Gila y Carlos Alberto Mañero Rodríguez

Servicio de Nefrología, Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada, España

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: [\(E. Hernández García\).](mailto:elena.46hg@hotmail.com)

0211-6995/© 2022 Sociedad Española de Nefrología. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

<https://doi.org/10.1016/j.nefro.2022.07.006>