



Since January 2020 Elsevier has created a COVID-19 resource centre with free information in English and Mandarin on the novel coronavirus COVID-19. The COVID-19 resource centre is hosted on Elsevier Connect, the company's public news and information website.

Elsevier hereby grants permission to make all its COVID-19-related research that is available on the COVID-19 resource centre - including this research content - immediately available in PubMed Central and other publicly funded repositories, such as the WHO COVID database with rights for unrestricted research re-use and analyses in any form or by any means with acknowledgement of the original source. These permissions are granted for free by Elsevier for as long as the COVID-19 resource centre remains active.

## COVID

P16

### Augmentation des surdosages et des décès en lien avec la consommation de méthadone durant la crise sanitaire liée au COVID 19 au regard des tendances observées en 2019

Elisabeth Frauger<sup>1,\*</sup>, Nathalie Fouilhé<sup>2</sup>, Clémence Lacroix<sup>1</sup>, Michel Mallaret<sup>2</sup>,

Joelle Micallef<sup>1</sup>, et le réseau Français d'Addictovigilance  
<sup>1</sup> Centre d'Addictovigilance Paca Corse, Service de Pharmacologie Clinique, Hôpital de la Timone, Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, Aix-Marseille Université, Institut de Neurosciences des Systèmes, Inserm UMR1106, 13005 Marseille, France

<sup>2</sup> Centre d'Addictovigilance, CHU de Grenoble-Alpes Grenoble, France

\* Auteur correspondant.

Adresse e-mail : [elisabeth.frauger@ap-hm.fr](mailto:elisabeth.frauger@ap-hm.fr) (E. Frauger)

**Introduction** Depuis sa commercialisation, les modalités d'accès à la méthadone sont encadrées en raison de ses propriétés pharmacologiques et du risque de surdosage. Suite au confinement, une surveillance renforcée est mise en place en raison du risque d'augmentation des surdosages : changement d'organisation des CSAPA ; mise en place de mesures dérogatoires pour la dispensation [1] ; contexte anxiogène ; faible diffusion de naloxone. L'objectif est de suivre la survenue de surdosages depuis janvier 2020 par rapport à 2019.

**Méthodes** Parmi les cas graves méthadone saisis dans la BNPV durant les 1<sup>ers</sup> semestres 2019 et 2020, ceux en lien avec un surdosage (signes cliniques, décès) sont retenus.

**Résultats** Parmi les 410 cas graves saisis, 280 sont des surdosages dont 133 sont survenus durant le 1<sup>er</sup> semestre (59 en 2019 et 74 en 2020). Si on tient compte des cas survenus ET notifiés la même année, on observe davantage de surdosages en 2020 (Fig. 1) : 2,2 fois plus de cas par rapport à 2019 et 3 fois plus de décès (21 versus 7). En 2020, le nombre de cas est plus important depuis le confinement (alors qu'il existe un temps de décalage entre la date de survenue et de déclaration). Les surdosages se caractérisent par : un usage dans le cadre d'un protocole ou hors prescription chez des sujets naïfs/consommateurs occasionnels ; une accessibilité via l'entourage direct ; des contextes de consommation variés (défoncé, à visée anxiolytique ou sédative, geste impulsif suite à un conflit, antalgique, festif, autolyse...) ; des consommations associées à d'autres déprimeurs respiratoires et cocaïne ; la faible mention d'utilisation de « take home » naloxone.

**Discussion** L'ensemble de ces données met en avant : une augmentation des indicateurs de morbi-mortalité en parallèle à l'augmentation de l'accessibilité de la méthadone (tendance exacerbée durant le confinement) et une méconnaissance de sa puissance pharmacologique et des risques par les sujets exposés




Figure 1 Répartition des cas de surdosage (décès + hors décès) survenus ET notifiés au 1<sup>er</sup> semestre de la même année (exclus pour 2019 les cas notifiés en 2020).

(et l'entourage). Devant l'ampleur des données, le réseau français d'addictovigilance a diffusé plusieurs informations [2] et rédigé des FAQ sur le site public d'information sur les médicaments [3] et l'ANSM a diffusé un point d'information [4].

**Déclaration de liens d'intérêts** Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.

**Références**

- [1] Ministère des solidarités et de la santé. Arrêté du 19 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19. 20 mars 2020. <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041737443&dateTexte=&categorieLien=id>. [Consulté le 7 janvier 2021].
- [2] Réseau français d'addictovigilance. Communiqué de l'Association Française des Centres d'Addictovigilance - Méthadone et confinement lié au COVID-19: assurer la continuité du traitement tout en maintenant la sécurité de son usage et intérêt de la naloxone. Avril 2020. <http://www.addictovigilance.fr/Methadone-et-confinement-lie-au>. [Consulté le 7 janvier 2021].
- [3] Société française de pharmacologie et de thérapeutique. Décembre 2020. <https://sfpt-fr.org/covid19-foire-aux-questions/>. [Consulté le 7 janvier 2021].
- [4] ANSM. L'ANSM rappelle les risques de la méthadone et l'importance de disposer de la naloxone - Point d'information. 16 juillet 2020. <https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/L-ANSM-rappelle-les-risques-de-la-methadone-et-l-importance-de-disposer-de-la-naloxone-Point-d-information>. [Consulté le 7 janvier 2021].

<https://doi.org/10.1016/j.therap.2021.01.029>

P17

### Étude COVIDOFFI : changements réglementaires, réduction des risques et adaptations de terrain. Les enseignements positifs de la crise COVID rapportés par les pharmaciens d'officine

Leila Chaouachi\*, Anne Batisse, Julie Heredia, Samira Djeddar  
 CEIP-Addictovigilance d'Ile de France-Centre-Val de Loire, Hôpital Fernand Widal, 200, rue du faubourg Saint Denis, 75010 Paris, France

\* Auteur correspondant.

Adresse e-mail : [leila.chaouachi@aphp.fr](mailto:leila.chaouachi@aphp.fr) (L. Chaouachi)

**Introduction** La crise sanitaire a profondément bousculé l'organisation du système de santé en France. Réduction des risques (masques, gel hydroalcoolique...), aménagement des espaces d'accueil (distanciation...), télémedecine, renouvellement dérogatoire des ordonnances expirées, ordonnances dématérialisées et nouveaux outils de communication... en sont quelques représentations. Ces changements ont concerné également la prise en charge des patients sous traitements psychoactifs. Le CEIP-Addictovigilance de Paris a recueilli l'avis des pharmaciens d'officine sur les enseignements COVID.

**Méthodes** Du 10 avril au 10 juin 2020, un questionnaire en ligne a été diffusé aux pharmaciens d'officine sur le territoire national pour recueillir les enseignements positifs tirés de la crise sanitaire.  
**Résultats** Au total, 203 pharmaciens ont répondu, dont 80 % déclarent avoir tiré des enseignements positifs de la crise sanitaire. Sur la Distanciation physique : 41,9 % des pharmaciens ont ainsi apprécié une amélioration de la confidentialité et 1 pharmacien sur 4 souhaite la conserver à l'avenir. Sur le Renouvellement Des Ordonnances : 61,1 % des pharmaciens ont renforcé les liens avec les médecins et de façon moindre avec les structures de prise en charge des addictions/associations d'usagers (10,8 %). Ils sont 87,7 % à souhaiter conserver le pouvoir de renouvellement des ordon-