

Tab. S1 Häufigkeitsverteilung der unterschiedlichen Befundkonstellationen im französischen Tumorkollektiv (nach [10])

	Klassischer Befund MSI-H & MLH1/PMS2 oder MSH2/MSH6 Verlust n=496	Ungewöhnlicher dMMR Befund				
		Gesamt n=89	isoliert PMS2 oder MSH6 Verlust Gruppe 1, n=53	dMMR klassisch & MSS/MSI-L Gruppe 2, n=16	pMMR & MSI-H/MSI-L Gruppe 3, n=5	komplexer MMR- Protein Verlust Gruppe 4, n=15
Prävalenz (gesamt)	85%	15%	59,6%	17,9%	5,6%	16,9%
Nicht-CRC	13,1%	32,6%	26,4%	62,5%	20,0%	26,7%
Genetisch/LS	21,4%	44,9%	45,3%	37,5%	53,3%	53,3%
MLH1/PMS2	70-80%	16,8%	Gruppe 2	11	kein MMR Ausfall	5x alle vier
MSH2/MSH6	20-30%	8,9%		5		3x drei
MSH6	s. ungewöhnlich	38,2%	32	2x Nicht-Heterodimere		
PMS2		28,1%	21	5x heterogen, unklar		